



SYMPOSIUM ORTHOPEDIE 2024

CHIRURGIE DE LA MAIN SELON « WALANT »

DR Q.RASMONT

Walant Surgery

- Wide
- Awake
- Local
- Anaesthesia
- No
- Tourniquet

Walant Surgery

- 2014
- Donald LALONDE

(R)évolution en chirurgie de la main



Walant Surgery

- Pourquoi ?

(+) PATIENT conscient et participant (patient partenaire)

MOTRICITÉ préservée (chirurgie tendineuse, ressaut, etc.)

contrôle SAIGNEMENT

ANTICOAGULANTS autorisés

Arrêt douleurs du GARROT(>20')

Walant Surgery

(-) Délai entre injection et incision – >25'

Anxiété patient (attente, sensations, interaction verbale, barrière linguistique ou intellectuelle, etc.)

Champ opératoire - infiltration – saignement

Durée chirurgie <2h

Walant Surgery

- Xylocaïne 1% + Adrenaline 1:200.000 (flapule préconditionnée)
- +1ml Bicarbonate (acidité AL)
- Aiguille 27G



Walant Surgery : Comment injecter

- Proximal -> distal
- Pression ferme tissus adjacents
- Traversée peau perpendiculairement
- Injection lente



How to inject LA almost
painlessly

By Don Lalonde
St John, New Brunswick

Walant Surgery P



Walant Surgery : Ténolyse



Walant Surgery – Take Home Msg

- Anesthésie locale 1% avec Adrénaline
- Chirurgie « participative » du patient
- Chirurgies tendineuses (& autres)





GHDC.be

