

MON ALIMENTATION APRES UNE SLEEVE



TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| 1. PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE AU GHdC | 4 |
| 2. RÈGLES DIÉTÉTIQUES | 4 |
| 3. ALIMENTATION APRÈS UNE SLEEVE | 5 |
| Phase 1 | 5 |
| Phase 2 | 6 |
| Phase 3 | 6 |
| 4. CONSEILS CULINAIRES LORS DE LA PREMIÈRE PHASE POSTOPÉRATOIRE | 7 |
| 5. IDÉES MENUS | 8 |
| 6. REMARQUES | 10 |
| 7. CONSEILS SUR L'ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE | 11 |
| 8. SUIVI DU POIDS | 12 |

Cher(ère) lecteur(trice),

Cher(ère) patient(e),

Cette brochure a été réalisée afin de vous aider et vous informer sur la réalimentation postopératoire d'une chirurgie de l'obésité.


Le but étant de vous orienter dans vos choix d'aliments et de veiller à votre équilibre alimentaire.

Lors de nos consultations, nous sommes de plus en plus confrontés aux informations données sur les réseaux sociaux ou reçues de l'entourage (famille, ami(e)s, collègues ...).

!!! Si certaines informations sont correctes, d'autres malheureusement, le sont moins.

Nous vous mettons en garde contre ce genre d'informations parfois néfastes. Nous restons à votre disposition pour toutes questions. N'attendez pas la consultation suivante. Si un doute persiste, n'hésitez pas à nous contacter.

Ce travail a été rédigé par un groupe de diététiciennes spécialisées dans la chirurgie bariatrique.



1. PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE AU GHdC

- Personnalisation et adaptation en fonction de votre rythme de vie.
- Soutien et écoute avant – pendant – après l'intervention.
- Evaluation et conseils pratiques à chaque rencontre.
- Correction des éventuels effets secondaires post-chirurgie (carences nutritionnelles, nausées, vomissements, dysphagies ...).
- Aide à l'optimisation de votre état nutritionnel afin de retrouver votre dynamisme.

2. RÈGLES DIÉTÉTIQUES

«Après l'intervention, une nouvelle manière de s'alimenter commence...»

- Fractionnez votre alimentation en 3 repas principaux et 1 à 3 collations si nécessaire.
- Ne forcez jamais.
- Mangez dans le calme et sans énervement.
- Prenez des petites bouchées et mâchez longuement les aliments (de façon à avoir une consistance lisse en bouche).
- Arrêtez-vous dès que vous ressentez l'effet de satiété («lourdeur» au niveau de l'estomac).
- Buvez 1,5l de boissons non caloriques, par petites gorgées (eau plate principalement, café, thé et tisane sans sucre ajouté).
Attendre 30 minutes avant et après les repas afin d'éviter une sensation de satiété trop rapide.
- Supprimez les boissons pétillantes. Elles peuvent dilater votre petit estomac et abimer les sutures internes.
- Évitez les boissons sucrées et alcoolisées.

3. ALIMENTATION APRÈS UNE SLEEVE

Phase 1

- A suivre durant 1 mois, temps nécessaire à une bonne cicatrisation.
- Cette texture permet d'éviter tout accrochage d'aliments durs/secs au niveau des cicatrices et d'engendrer des complications (douleurs gastriques, nausées, vomissements, rupture des sutures internes...).

| | |
|--|--|
| Déjeuner | Laitage bien lisse : une crème ou un yaourt sans morceaux ou yaourt à boire ou une semoule de riz ou un fromage blanc nature/fruits mixés ou un verre de lait demi-écrémé ou boisson végétale. |
| Collation (si nécessaire) | Un potage digeste ou jus de fruits sans sucre ajouté sans pulpes ou une compote de fruits sans sucre ajouté ou une crème ou un yaourt sans morceaux ou une semoule de riz ou un fromage blanc nature/fruits mixés ou un verre de lait demi-écrémé, etc. |
| Diner | 30g de viande moulue ou 30g de volaille moulue ou 30g de poisson émietté ou 1 œuf en omelette + 30g de pommes de terre en purée + 30g de légumes digestes ⁽¹⁾ cuits mixés + 2 à 3 cuillères de bouillon dégraissé, sauce de viande dégraissée, sauce blanche dégraissée, crème allégée ⁽¹⁾ Aubergine, carotte, blanc de poireau, chicon, fenouil, vert de scarole, épinard, courgette, brocoli, chou-fleur, potiron, navet, panais, haricot vert très fin. |
| Collation (si nécessaire) | Idem |
| Souper | Un potage ou 50 à 100g de mousse de charcuterie maigre ou 50 à 100g de mousse de poisson (voir recette page 13) |
| Collation (si nécessaire) | Idem |
| Boissons : eau plate, café/thé SANS SUCRE AJOUTÉ | |

Phase 2

- Elargissement vers une texture tendre, facile à manger. Selon votre tolérance et après les visites auprès du chirurgien et de la diététicienne.

| | |
|--|--|
| Déjeuner | 1 à 2 biscotte(s) ou 1 à 2 cracotte(s) + un peu de matière grasse + fromage à tartiner |
| Collation (si nécessaire) | Un potage ou un jus de fruits sans sucre ajouté ou fruits cuits au jus naturel |
| Dîner | 50g de viande/volaille coupée en petits morceaux ou 50g de poisson ou 1 œuf en omelette + 50g de pommes de terre ou purée ou pâtes bien cuites ou riz bien cuit ou semoule bien cuite + 50g de légumes cuits + 2 à 3 cuillères de bouillon dégraissé ou sauces de viande dégraissée ou sauce blanche dégraissée ou crème allégée. |
| Collation (si nécessaire) | Une crème ou un yaourt aux fruits ou une semoule de riz ou un fromage blanc aux fruits ou un verre de lait demi-écrémé |
| Souper | 1 à 2 biscottes ou 1 à 2 cracottes + un peu de matière grasse + fromage blanc/frais/fondu ou fine tranche de fromage ou fine tranche de charcuterie maigre ou poisson froid |
| Collation (si nécessaire) | Un potage ou un jus de fruits sans sucre ajouté ou fruits cuits au jus naturel ou une crème ou un yaourt aux fruits ou une semoule de riz ou un fromage blanc aux fruits ou un verre de lait demi-écrémé |
| Boissons : eau plate, café/thé SANS SUCRE AJOUTÉ | |

Phase 3

- Tous les aliments peuvent être introduits (excepté les boissons pétillantes et les aliments sucrés) selon le principe de l'alimentation équilibrée (Voir page 11).

Apports protéinés

Les apports sont surveillés grâce à une prise de sang (médecin) et/ou anamnèse alimentaire (diététicienne).

Si une carence en protéines est objectivée, des mesures nutritionnelles seront mises en place (enrichissement naturel ou sous forme de complément alimentaire).

Les premiers signes physiques avant les signes biologiques sont : perte de cheveux, ongles cassants, déchaussement dentaire, fatigue.

Constipation

Lors du début de la réalimentation d'une sleeve, les patients signalent souvent la présence d'une légère constipation. Celle-ci est due à un manque d'apport en fibres dans votre alimentation (fruits, légumes, céréales complètes), le transit est donc ralenti.

→ Si votre constipation devient inconfortable, consultez immédiatement votre chirurgien ou votre médecin traitant.

Carences en vitamines et minéraux

Des carences en vitamines et minéraux peuvent se présenter. Il est donc indispensable de prendre les suppléments prescrits par le chirurgien.

4. CONSEILS CULINAIRES LORS DE LA PREMIÈRE PHASE POSTOPÉRATOIRE

Vous pouvez préparer votre repas chaud principal de 2 manières : soit tous les aliments mixés ensemble dans un bol, soit les aliments mixés séparément dans votre assiette pour plus de plaisir gustatif.

Présentation des aliments mixés ensemble dans un bol :

- Cuire les 3 familles d'aliments à la vapeur, dans l'eau ou au court-bouillon.
- Puis mixer le tout avec du lait demi-écrémé, 1 c à c. de beurre (allégé) et/ou un peu de bouillon dégraissé afin de réaliser une potée bien lisse.
- Assaisonner modérément avec du sel, du poivre et de la noix de muscade.

Éviter les épices fortes (curry, piments, pickles ...).

Présentation dans votre assiette des aliments mixés séparément :

- Cuire à l'eau ou à la vapeur ou au court-bouillon, les légumes et les pommes de terre.
- Préparer la purée de pommes de terre avec 1 c à c. de beurre (allégé) et avec un peu de lait demi-écrémé.
- Mixer les légumes cuits avec du bouillon dégraissé ou accompagnés d'une sauce blanche allégée ou d'un peu de crème fraîche allégée.
- Cuire la viande en papillote, à la vapeur, à la poêle avec 1 c à c. de matière grasse.
- Mixer la viande/volaille/poisson et accompagner celle-ci avec une sauce dégraissée (2 à 3 c à s.).
- Assaisonner modérément avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Éviter les épices fortes (curry, piments, pickles ...).

NB : Vous pouvez réaliser des potées de légumes et de purée de pommes de terre mélangées ensemble. Vous pouvez aussi préparer à l'avance ces potées en les congelant.

5. IDÉES MENUS



- Roti de porc, épinards à la sauce blanche, purée de pomme de terre
 - Blanc de Poulet, courgettes, purée de pomme de terre
 - Hachis de bœuf, potée aux carottes
 - Sauté de veau, scarole à la crème, purée de pomme de terre
-
- Poisson à la sauce Aurore, chicons, purée de pomme de terre
 - Filet dinde, haricots verts, purée de pomme de terre
 - Omelette, fenouil, purée de pomme de terre

Idée : penser à mettre de petites portions dans des pots afin de les conserver au frigo et les emporter facilement au travail

Sauce dégraissée

Ingrédients :

- 1 cube de viande/volaille dégraissé
- Faire bouillir 100ml d'eau chaude
- Faire dissoudre le cube dans l'eau

Recette lait aux fruits

Ingrédients

- 1 verre de lait entier (200ml)
- 3 c à s de yaourt entier (50ml)
- 3 fruits au jus (80g) ou 1/2 banane (75g)

Mélanger tous les ingrédients.

Recette compote aux 3 fruits

Ingrédients (pour 2 portions)

- 3 fruits au choix
- Pelez, évidez, coupez les fruits
- Mettez-les dans une casserole avec 2 c à s. d'eau
- Portez à ébullition, ensuite cuisez à feux doux jusqu'à cuisson des fruits
- Réduisez en purée la préparation

Recette pudding vanille

Ingrédients

- 125ml de lait entier
 - 7g de poudre pudding vanille
 - 13g de sucre
-
- Diluer la poudre pudding avec un peu de lait.
 - Faire bouillir le lait avec le sucre.
 - Une fois de lait porté à ébullition, retirer du feu et ajouter la poudre pudding vanille en fouettant.
 - Porter une nouvelle fois à ébullition.
 - Verser dans les pots.
 - Réserver au froid.

Recette sauce blanche allégée

Ingrédients (pour 2 portions) :

- 250ml de lait 1/2 écrémé
- 15g beurre
- 15g farine
- Sel, poivre, muscade
 - Chauffez le lait
 - Préparez le roux en faisant fondre le beurre avec la farine
 - Versez le lait bien chaud en fouettant sans arrêt pour éviter la formation de grumeaux
 - Salez, poivrez, ajoutez un peu de noix de muscade

6. REMARQUES

En cas de vomissements, d'ingestion de de nausées.



Posez-vous les questions suivantes pour rechercher si vous n'avez pas commis une erreur dans votre comportement alimentaire.


- Ai-je mangé trop vite ?
- Ai-je suffisamment mâché les aliments ?
- Ai-je trop mangé ?
- Les bouchées étaient-elles trop grandes ?
- Ai-je bu pendant les repas ?
- Ai-je bu trop vite après les repas ?
- Suis-je allé(e) m'allonger trop vite après les repas ?

Si vous avez l'impression que la nourriture reste bloquée ou si vous ressentez de vives douleurs, arrêtez-vous immédiatement de manger. Si vous sentez que les liquides ne passent pas ou plus, contactez votre chirurgien et présentez-vous dans un service d'urgence.

7. CONSEILS ALIMENTATION ÉQUILBRÉE

«Au long terme, votre alimentation doit être saine et équilibrée»

- Consommez les 3 repas principaux par jour (déjeuner, dîner et souper)
- Si nécessaire, vous pouvez prendre une collation entre les repas. A ne pas confondre avec le grignotage.
 - 1 laitage (végétal), fromage, noix, noisettes, etc.
 - 1 fruit ou 1 potage
- Consommez tous les jours :
 - Des féculents à chaque repas
 - 2 portions de légumes (cuits, crudités, potage)
 - 2 à 3 portions de protéines animales (viande, volaille, poisson, œufs, charcuterie)
 - Un peu de matière grasse
- Pensez à une activité physique régulière
 - Pour commencer une activité physique, il faut le feu vert du chirurgien
- Votre assiette doit être équilibrée :
 - 1/2 assiette de légumes
 - 1/4 assiette de féculents
 - 1/4 de viande, volaille, poisson, œufs





Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre diététicienne.

Coordonnées

Service diététique

Site Saint-Joseph : 071 10 70 32

Site Notre Dame : 071 10 26 65

Rédaction : diététiciennes cliniques