

NUMÉROS DE CONTACT

ÉQUIPE DE DIABÉTOLOGIE

Site Saint-Joseph

 071 10 76 20


Site Notre Dame

 071 10 27 06


www.ghdc.be



HYPO



HYPER



PÉRIDURALE & DIABÈTE

Centre Multidisciplinaire de Traitement de la Douleur Chronique

Les effets des corticoïdes sur le métabolisme du glucose occasionnent une hyperglycémie.


LA PÉRIDURALE EST AUTORISÉE EN CAS DE DIABÈTE

Vous êtes sous médicaments (Glucophage®, Metformax®...)

- Ne pas arrêter votre traitement.
- Vérifiez l'équilibre de votre diabète. Lors de votre dernier contrôle sanguin assurez-vous que l'hémoglobine glycosylée (Hb A1C) est inférieure à 7.
Si le taux est supérieur à 9 : demandez l'adaptation de votre traitement à votre médecin traitant ou à votre diabétologue.

Si vous êtes suivi au GHdC, téléphonez aux infirmières de référence en diabétologie.

- Dans la semaine qui suit la péridurale, respectez bien votre régime, votre traitement et évitez les excès alimentaires. Contrôlez régulièrement votre glycémie si vous disposez d'un appareil à domicile.



Vous êtes sous insuline

- 1 injection par jour

Contrôlez votre glycémie pendant une semaine après la péridurale. Si vous êtes suivi par votre médecin traitant référez-vous à lui. Si vous bénéficiez «du trajet de soin» téléphonez à l'infirmière au 071/33.33.33 qui vous conseillera.

- 2 injections par jour

Si vous êtes conventionné, prenez contact avec votre centre afin d'être conseillé et contrôlez vos glycémies pendant minimum une semaine après la péridurale.

Votre péridurale est réalisée en urgence

Votre diabète...

- Est équilibré (Hb A1C inférieure à 7)

Pas de problème mais prudence, respectez le régime la semaine qui suit la péridurale.

- Est mal équilibré (Hb A1C supérieure à 9)

→ L'infiltration accentue le déséquilibre. Le médecin jugera avec vous de sa nécessité.

→ La péridurale doit être réalisée. Après celle-ci téléphonez à votre médecin traitant ou à l'équipe de diabétologie pour adapter votre traitement.