

CONSÉQUENCES EN CAS DE REFUS OU DE RETRAIT DU CONSENTEMENT

Globe vésical : la vessie ne sait pas se vider, les conséquences spécifiques à votre cas vous sont expliquées par l'urologue.





www.ghdc.be

CHIRURO-CE-002
COM_575 (28/04/23)



CATHÉTÉRISME SUS-PUBIEN OU CYSTOCATH



INFORMATIONS CONSENTEMENT

CATHÉTÉRISME SUS-PUBIEN OU CYSTOCATH

OBJECTIF

La vessie est un réservoir qui reçoit l'urine venant des reins. Vous la videz plusieurs fois par jour lorsque vous allez aux toilettes.

Si la vessie ne se vide pas spontanément à cause d'un obstacle (prostate, rétrécissement de l'urètre...), il est nécessaire de permettre à l'urine de s'écouler vers l'extérieur par le placement d'un cathéter.

NATURE

Placement d'un cathéter dans la vessie au travers de la paroi abdominale, juste au-dessus du pubis. Le plus souvent, ce geste est réalisé sous anesthésie locale. Ensuite, le cathéter est fixé par un fil ou retenu par un ballonnet (selon le type de sonde). Les avantages sont de laisser l'urètre libre (plus confortable qu'une sonde) et de permettre de contrôler la reprise des mictions par voie naturelle (rééducation vésicale).

DEGRÉ D'URGENCE

Voir avec votre urologue.

DURÉE

Le temps nécessaire pour retrouver une continence normale (voir l'urologue).

CONTRE-INDICATIONS

Tumeur vésicale, cicatrice abdominale basse, prise d'anticoagulants, pontage fémoro-fémoral croisé.

EFFETS SECONDAIRES

- ▶ La peau est irritée par le collant des pansements : positionner le collant à différents endroits lors du changement du pansement
- ▶ L'urine coule à côté du cathéter, le pansement est mouillé : le cathéter est peut-être bouché ou déplacé, contacter l'urologue ou votre infirmier (ère) qui pourra tenter de le rincer.
- ▶ Vous ressentez un besoin intense d'uriner, soit :
 - ◆ Le sac se remplit normalement : il s'agit d'un SPASME de votre vessie qui veut « chasser » ce corps étranger. Cela sera résolu par la prise d'un médicament
 - ◆ Le sac ne se remplit pas : vérifier que le tuyau ne soit pas coudé. si ce n'est pas le cas, il est obstrué par des dépôts.

RISQUES PERTINENTS

- ▶ Infection locale à généralisée.
- ▶ Saignement avec ou sans hématome.
- ▶ Sang dans les urines.
- ▶ Perte du cathéter.
- ▶ Obstruction due à la torsion de la sonde ou dépôts dans les urines.
- ▶ Plaie digestive (perforation de l'intestin).

SOINS DE SUIVI

- ▶ Le cathéter est changé tous les 2 à 3 mois.
- ▶ Un pansement local est à remplacer tous les deux à trois jours par un(e) infirmier(ère).
- ▶ L'infirmière change l'eau du ballonnet toutes les semaines afin d'en vérifier la quantité.
- ▶ Si le ballonnet ne retient plus l'eau, il faut changer la sonde avant de la perdre.
- ▶ Le changement du sac à urine est à réaliser tous les 5 jours, il est remboursé par la mutuelle.

ALTERNATIVES

- ▶ Sonde vésicale.
- ▶ Intervention chirurgicale.

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

Code du placement : 262441/262430

Code de remplacement : 262463/262452

Contactez le Service Financier Patient
071/10.80.00 (entre 08h30 et 14h00)
Service.financier.patients@ghdc.be

Site Reine Fabiola
Avenue du Centenaire, 73
6061 Montignies-sur-Sambre

Des permanences sont organisées sur le site Reine Fabiola les lundis et mardis de 08h30 à 12h00 et les mercredis et jeudis de 12h30 à 16h00.