



EXTRACTION MANUELLE DE SELLES



INFORMATIONS CONSENTEMENT

EXTRACTION MANUELLE DE SELLES



www.ghdc.be

GERIA-CE-001

COM_555 (21/02/23)

OBJECTIF

L'extraction manuelle de selles est appropriée dans les cas suivants :

- D'autres méthodes de vidange intestinale ont échoué (lavement, laxatif ...).
- En présence d'un fécalome.
- en cas de défécation incomplète.
- en cas d'incapacité à déféquer.

L'objectif de cette intervention consiste à aider l'évacuation de selles et ainsi prévenir ou traiter l'accumulation de selles dans l'ampoule rectale.

NATURE

La défécation est essentielle pour permettre à une personne d'éliminer les déchets et de maintenir le fonctionnement de l'intestin.

Si la défécation ne peut être spontanée, le retrait manuel sera recommandé pour l'évacuation des matières fécales.

L'accumulation de selles dures et volumineuses dans l'ampoule rectale peut provoquer un inconfort.

DEGRÉ D'URGENCE

Le degré d'urgence de la procédure sera évalué en fonction de l'inconfort de la personne ou de ses habitudes de défécation. Toute (sub-)occlusion nécessitera une intervention immédiate.

FRÉQUENCE

La fréquence sera adaptée par rapport à l'objectif recherché. L'évacuation peut être soit unique ou régulière (de tous les jours à 1 jour / 3 en fonction des habitudes de vie et de l'inconfort).

En cas de reprise normale de la défécation, cette action sera suspendue.

DURÉE

Environ 5 à 10 minutes.

CONTRE-INDICATIONS

- Hémorroïdes.
- Risque d'hémorragie.

EFFETS SECONDAIRES

- Douleurs.
- Lésion de la muqueuse.
- Saignement.
- Malaise vagal.

RISQUE PERTINENT

Néant.

SOINS DE SUIVI

Suivi de l'inconfort, d'un saignement éventuel
Suivi d'une reprise de transit

ALTERNATIVES

- Lavement évacuateur.
- Prise de laxatifs en quantité.

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

Ce soin fait partie du prix de la journée d'hospitalisation et ne donne lieu à aucun supplément à charge du patient.

CONSÉQUENCES EN CAS DE REFUS OU DE RETRAIT DU CONSENTEMENT

En cas de refus ou de retrait du consentement, l'accumulation de selles dans l'ampoule rectale va se poursuivre pouvant causer la survenue de complications, dont la principale est l'occlusion intestinale