


## LOCALISATION DE L'INFLAMMATION AU COURS DES MICI

### MALADIE DE CROHN :

Tous les segments  
du tube digestif (de  
la bouche à l'anus)  
peuvent être atteints.

### RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE :

Rectum  
Côlon



## SYMPTÔMES



Inflammation du tube digestif provoquant:

- Douleurs abdominales
- Diarrhée (entre 4 à 20 selles par jour)
- Impériosité des selles
- Perte d'appétit et amaigrissement
- Grande fatigue
- Fièvre

Alternance entre phases de poussée (crise) et de rémission.



### Symptômes extra digestifs

L'inflammation peut se localiser en dehors  
de l'intestin et provoquer des manifestations  
rhumatismales, oculaires et/ou cutanées

COM\_211

## Comment nous contacter ?

Pour toutes informations sur les MICI,  
contactez les secrétariats de consultation  
de gastro-entérologie :

- ✓ Site Saint-Joseph : 071 10 71 57
- ✓ Site Notre Dame : 071 10 27 70
- ✓ Site Sainte-Thérèse : 071 10 91 59
- ✓ Site IMTR: 071 10 60 33

Pour obtenir un rendez-vous chez un  
gastro-entérologue, contactez le

071 10 20 20

Grand Hôpital de Charleroi  
[www.ghdc.be](http://www.ghdc.be)



# LES MICI

## Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales



## De quoi s'agit-il ?

Il s'agit des **Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales** !

En Belgique, près de 30000 patients souffrent d'une MICI.

Il en existe essentiellement 2 types :

- la maladie de Crohn
- la rectocolite ulcérohémorragique

Ces deux maladies se caractérisent par une inflammation d'une partie plus ou moins étendue du tube digestif.

Cette inflammation chronique peut être à l'origine de lésions détruisant progressivement l'intestin. Les causes et les mécanismes de ces maladies sont encore inconnus à ce jour.

Typiquement, les MICI évoluent par « poussées », durant lesquelles la maladie est active, en alternance avec des périodes de rémission où la maladie est inactive.

Actuellement, il n'est pas possible de guérir les MICI. Cependant, différents traitements efficaces existent pour maintenir la maladie en rémission et éviter les poussées et la destruction de l'intestin!

## Que faire en cas de symptômes évocateurs d'une MICI?

En cas de symptômes digestifs évocateurs d'une MICI, dans un premier temps, il est conseillé de **consulter votre médecin traitant**.

Il faut en effet rechercher d'autres causes plus fréquentes de symptômes digestifs comme une infection, par exemple.

En cas de forte suspicion de MICI, votre médecin traitant vous adressera chez un gastro-entérologue pour pratiquer des examens complémentaires.

En cas de confirmation d'une MICI, un traitement vous sera proposé.



## Une équipe pluridisciplinaire au GHdC

Au Grand Hôpital de Charleroi nous avons développé une équipe pluridisciplinaire qui rassemble

- ✓ des gastro-entérologues
- ✓ des chirurgiens digestifs
- ✓ des radiologues
- ✓ des rhumatologues
- ✓ des infirmières spécialisées

afin de soigner chaque patient porteur d'une MICI dans sa globalité.

En outre, nous disposons d'un centre de traitement ambulatoire spécifiquement dédié aux MICI.

Nous participons également à plusieurs études cliniques dans le domaine des MICI.